

MRONJ stadium	Behandelstrategie
Vóór de start van i.v. medicatie	Focusonderzoek en sanering patiënten
Vóór de start van orale medicatie	Patiënten voorlichting
Stadium 0	
Niet-specifieke symptomen of klinische en radiologische tekenen zonder klinische tekenen van botnecrose	Systemische behandeling, inclusief pijnmedicatie en antibiotische behandeling
Stadium 1	
Blootliggend necrotisch bot bij asymptomatische patiënten die geen tekenen van ontsteking hebben	Mondspoelingen met antimicrobiële werking Klinische controle 4/ jaar Patiënten voorlichting en evaluatie van de indicatie van bisfosfonaat therapie
Stadium 2	
Blootliggend necrotisch bot/ sondeerbaar bot met pijn en ontsteking.	Mondspoelingen met antimicrobiële werking Orale breedspectrum antibiotische therapie Pijnmedicatie Debridement om de irritatie van weke delen te behandelen
Stadium 3	
Blootliggend necrotisch bot/sondeerbaar bot bij patiënten met pijn, ontsteking en één of meer van de volgende kenmerken: <ul style="list-style-type: none"> • Blootliggend necrotisch bot uitbreidend buiten de regio van de processus alveolaris, namelijk de onderrand of opstijgende tak van de mandibula, de sinus maxillaris of het zygoma • Pathologische fractuur • Extraorale fistel • Oroantrale of oronasale communicatie • Osteolyse uitbreidend tot de onderrand van de mandibula of de bodem van de sinus maxillaris 	Mondspoelingen met antimicrobiële werking Orale breedspectrum antibiotische therapie Pijnmedicatie Debridement of kaakresectie, ter palliatie van pijn en infectie

Tabel 4. Behandelstrategie voor medicatiegerelateerde osteonecrose van de kaak per stadium (gebaseerd op gegevens uit NVMKA, 2015).